

A.M.M n°	2210251
Composition	Cyazofamide 40 g/l + folpel 400 g/l
Formulation	Suspension Concentrée (SC)

Classement CLP : H317 - H332 - H351 - H400 - H410



EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Délai de rentrée : 48h

Usages autorisés	Cultures	Dose maximale d'emploi	Nombre maximal d'applications (intervalle minimum entre les applications)	Stade d'application	DAR	ZNT aquatique
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Uniquement sur raisin de table	2,5 L/ha	2/an (10 jours)	Entre les stades BBCH 15 et BBCH 69 (*)	F (BBCH69)	20 m (dont DVP 20 m)
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Uniquement sur raisin de cuve	2,5 L/ha	2/an (10 jours)	A partir du stade BBCH 15	28 jours	20 m (dont DVP 20 m)

(*) BBCH 15 : 5 feuilles étalées, BBCH 69 : fin floraison

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Spe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau.

Spa 1 : Pour éviter le développement de résistances du mildiou de la vigne au cyazofamide, il conviendra de limiter le nombre d'applications du produit à 2 applications maximum par cycle cultural sur vigne.

Afin de gérer au mieux les risques de résistance, il est recommandé de suivre les limitations d'emploi par groupe chimique préconisées par la note relative à la gestion des résistances des maladies de la vigne.

Protection des personnes présentes et des résidents (au sens du règlement (UE) N°284/2013)

Respecter une distance d'au moins 10 mètres entre le dernier rang traité et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

L'utilisation de ce produit sur ses usages autorisés n'est recommandée que sur les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessus. Certis Belchim BV décline en conséquence toute responsabilité en cas d'utilisation du produit sur des cultures ou pour des cibles non recommandées.