

NEGEV

A.M.M n°	2160064
Composition	Fludioxonil 50 g/L + tébuconazole 10 g/L
Formulation	Suspension concentrée pour traitement de semences (FS)

Classement CLP : H410

Attention



Délai de rentrée : non applicable (traitement de semences).

Usages autorisés	Cultures	Cibles	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	DAR
Blé*Trt Sem.*Champignons autre que pythiacées	Blé, Triticale, Epeautre	Charbon nu, Charbon foliaire, Caries, Fusarioses (<i>Microdochium</i> spp. & <i>Fusarium</i> spp.), Septoriose	0,1 L/q	1 / an	DAR F
Orge*Trt Sem.*Champignons autre que pythiacées	Orge	Charbon nu, Charbon couvert de l'orge, Fusarioses (<i>Microdochium</i> spp. & <i>Fusarium</i> spp.), Helminthosporioses (<i>D. gramineum</i> & <i>D. teres</i>)	0,1 L/q	1 / an	DAR F
Seigle*Trt Sem.*Champignons autre que pythiacées	Seigle	Charbon foliaire, Fusarioses (<i>Microdochium</i> spp. & <i>Fusarium</i> spp.)	0,1 L/q	1 / an	DAR F
Avoine*Trt Sem.*Champignons autre que pythiacées	Avoine	Charbon nu, Charbon couvert de l'orge, Fusarioses (<i>Microdochium</i> spp. & <i>Fusarium</i> spp.)	0,1 L/q	1 / an	DAR F

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

SPe5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s'assurer que les semences traitées sont également incorporées au bout des sillons.

L'utilisation de ce produit sur ses usages autorisés n'est recommandée que sur les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessus. Certis Belchim BV décline en conséquence toute responsabilité en cas d'utilisation du produit sur des cultures ou pour des cibles non recommandées.